

序号 1：贝因美臻爱婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）800克 变更标签稿件

贝因美臻爱

1段
净含量:800克
婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)

国食注字YP20230461

配料 Ingredients

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酰基丙三酯、低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、棕榈仁油、玉米油、椰子油、猪油)、全脂乳粉、低聚半乳糖(GOS)、低聚果糖(FOS)、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白磷酸肽、核苷酸、5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、遁石酸胆碱(胆碱)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱/己糖盐(左旋肉碱)、胆酸盐、碳水化合物、氯化钾、氯化镁、碘化钾、亚硒酸钠、L-抗坏血酸钠(维生素C)、醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、d-α-生育酚(维生素E)、植物中棕榈酸(维生素K)、盐酸叶酸(维生素B₉)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氯化胆碱(维生素B₃)、烟酰胺、D-泛酸钙(泛酸)、叶酸、D-生物素、D-泛酸钙(泛酸)、花生四烯酸(ARA)、二十碳五烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、L-抗坏血酸(维生素C)、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁。

本品含生乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品, 对其过敏者慎用。

贝因美股份有限公司(注册代码02570)
地址: 浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢
电话: 0571-28077000
产品标准号: GB 10765-2021
产品类别及属性: 婴儿配方乳粉(乳基)
生产日期/批号: 见罐底
保质期: 24个月
贮存条件: 常温, 阴凉干燥处
制造商: 北海贝因美营养食品有限公司
生产地址: 北海市北海大道工业厂区11号
产地: 广西北海
生产许可证编号: SC12945050200028

6 904591 019530 >

营养成分表 nutrition information		
项目/items	每100克/100g	每100克/100g
能量/energy	kJ 100	2146
蛋白质/protein	g 0.51	11.00
乳清蛋白/whey protein	g 0.32	6.89
脂肪/fat	g 1.26	27.00
亚油酸/linoleic acid (LA)	g 0.21	4.60
α-亚麻酸/α-linolenic acid (ALA)	mg 21	460
碳水化合物/carbohydrate	g 2.5	54.7
乳糖/lactose	g 2.5	54.7
维生素/vitamins		
维生素A/vitamin A	μg RE 18	380
维生素D/vitamin D	μg 0.59	12.60
维生素E/vitamin E	mg α-TE 0.19	4.00
维生素K/vitamin K	mg 2.42	51.00
维生素B ₁ /vitamin B ₁	mg 0.25	5.00
维生素B ₂ /vitamin B ₂	mg 0.30	6.35
维生素B ₆ /vitamin B ₆	mg 10.6	226.5
维生素B ₉ /vitamin B ₉	μg 0.047	1.000
烟酰胺/nicotinamide	μg 183	3920
叶酸/folic acid	μg 3.7	79.0
泛酸/panthothenic acid	μg 149	3200
维生素C/vitamin C	mg 5.6	120.0
生物素/biotin	μg 0.57	12.20
胆碱/choline	mg 6.1	130.0
矿物质/minerals		
钠/sodium	mg 9	188
钾/potassium	mg 22	462
铜/copper	μg 17.9	364.0
镁/magnesium	mg 1.4	30.0
锌/zinc	mg 0.20	4.20
钴/cobalt	mg 0.19	4.00
锰/manganese	mg 1.68	36.00
碘/iodine	mg 0.18	389
磷/phosphorus	mg 11	240
碘/chloride	mg 4.5	97.5
碘/selenium	μg 0.90	19.40
可选添加成分/optional nutrients		
胆酰乙醇酸/butyryl ester	mg 1.3	27.0
牛磺酸/taurine	mg 1.8	38.0
左旋肉碱/L-carnitine	mg 0.4	8.8
二十碳六烯酸/omega-6 docosahexenoic acid(DHA)	mg 4.7	100.0
二十四碳九烯酸/omega-9 docosanoic acid(DA)	mg 7.0	150.0
胆碱/胆碱/beta-alanido-D-glucoside	g 0.107	2.3
胆碱/胆碱/beta-alanido-D-glucoside	g 0.070	1.50
1,3-二酰-2-氨基丙酸甘油三酯/1,3-dioleoyl-2-amino-glycerol	g 0.20	4.2
叶黄素/Zeaxanthin	μg 2.3	50.0
胆甘露寡糖/nucleotides	mg 14	30.0
乳铁蛋白/lactoferrin	mg 18	38.0
酪蛋白磷酸肽/casein phosphopeptides	mg 14	30.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克。

贝因美®

转奶小贴士 Milk transfer tips

新奶粉	原奶粉
奶粉会随年龄阶段而配方不同, 为了顺利过渡, 需要给宝宝循序渐进的进行转换的过程, 以宝宝每次只更换奶粉为原则。	
第1-3天	第4-5天
第6-7天	第8-9天
第10天	

温馨提示: 转奶粉应在宝宝身体健康时进行, 在生病或出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时, 转奶粉时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握宝宝转奶后的适应情况。
以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

贝因美臻爱婴儿配方奶粉

重要声明 Important Notice

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

冲调及食用方法 Preparation

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。

- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50℃, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
- 按调哺用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。

- 盖好瓶盖, 摆晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
- 调哺前测试奶的温度是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在小时内喂养, 食用后剩余的奶液应弃用。

-5-

03 GOK

序号 2：贝因美臻爱婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）150克 变更标签稿件



贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）标签变更证书

国家市场监督管理总局 婴幼儿配方乳粉产品配方变更注册证书

（编号：国食注更字 YP20240203）

产品名称	通用名称	较大婴儿配方奶粉（6—12月龄，2段）				
	商品名称	贝因美臻爱				
	英文名称	-				
企业名称	中文	北海贝因美营养食品有限公司				
	英文	-				
注册号	国食注字 YP20230462	有效期至	2028年11月13日			
审批结论	<p>经批准，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》的规定，现予变更注册。</p> <p>变更内容为：标签非主要展示版面（顶盖）增加注册商标“贝因美”；标签上删除认证项目“GMP”“HACCP”“ISO9001质量管理体系”“ISO14001环境管理体系”；标签图形变更，标签非主要展示版面（顶盖）增加图形。</p> <p>除上述变更信息外，原证书所载其余信息继续有效。</p>					
变更日期	2024年09月13日					
备注						



序号 3：贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）800克 变更标签稿件

贝因美臻爱

2段
净含量:800克
**较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)**

国食注字YP20230462

配料 Ingredients

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、棕榈仁油、玉米油、椰子油、猪油)、全脂乳粉、乳糖、低聚半乳糖(GOS)、脱氢乳粉、低聚果糖(FOS)、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白磷酸钙、低聚果糖(5-葡萄糖二钠、5-寡苷酸二钠)、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、酒石酸钾脂肪酸盐(粗盐)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐(左旋肉碱)、胆酸钙、胆酸镁、碘酸钾、碘化钾、柠檬酸镁、硫酸镁、碘化钾、亚硒酸钠、L-抗坏血酸钠(维生素C)、醋酸氟康唑(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、d-α-醋酸软脂酰(维生素E)、植物中维生素(维生素K)、盐酸溴胺素(维生素B1)、核黄素(维生素B2)、盐酸吡哆醇(维生素B3)、核酮胺(维生素B5)、泛酸(维生素B6)、烟酰胺(维生素B7)、生物素(维生素B8)、叶酸(维生素B9)、生物素(维生素B10)、胆碱(choline)。

营养成分表 nutrition information

项目/items	每100克/每100克	每100克/每100克
能量/energy	kJ 100	2040
蛋白质/protein	g 0.64	13.00
乳清蛋白/whey protein	g 0.26	5.30
脂肪/fat	g 1.11	22.60
亚油酸/linoleic acid (LA)	g 0.18	3.70
α-亚麻酸/α-linolenic acid (ALA)	mg 18	370
碳水化合物/carbohydrate	g 2.7	5.60
乳糖/lactose	g 2.7	5.60

维生素/vitamins

维生素A/vitamin A	μg RE 23	465
维生素D/vitamin D	μg 0.60	12.30
维生素E/vitamin E	mg α-TE 0.26	5.40
维生素K/vitamin K	mg α-TG 1.47	31.00
维生素B1/vitamin B1	mg 18	36.00
维生素B2/vitamin B2	mg 0.37	7.50
维生素B3/vitamin B3	mg 13.8	281.5
维生素B5/vitamin B5	μg 0.074	1.500
烟酰胺/nicotinamide	μg 200	4076
叶酸/folic acid	μg 3.0	62.0
泛酸/panthothenic acid	μg 127	2560
维生素C/vitamin C	mg 4.9	100.0
生物素/biotin	μg 0.52	10.51
胆碱/choline	mg 6.1	123.5

矿物质/minerals

钠/sodium	mg 8	160
钾/potassium	mg 23	460
铜/copper	μg 11.8	240.0
镁/magnesium	mg 1.5	31.0
铁/iron	mg 0.34	7.00
锰/manganese	mg 0.20	4.00
碘/iodine	μg 7.2	35.00
钙/calciun	mg 25	500
磷/phosphorus	mg 18	357
氯/chloride	mg 4.6	93.0
氯化钾/chloride	mg 19	380
硒/seleium	μg 0.64	13.00

可选添加成分/optional nutrients

肌醇/inositol	mg 1.5	30.0
牛磺酸/taurine	mg 2.0	40.0
左旋肉碱/L-carnitine	mg 0.4	7.8
二十碳六烯酸/20:6n-3(docosahexenoic acid/DHA)	mg 4.7	95.0
二十碳五烯酸/20:5n-3(eicosapentaenoic acid/EPA)	mg 7.0	142.5
低聚果糖/β-D-fructofuranosidase	g 0.115	2.3
低聚果糖/α-D-glucosidase	g 0.074	1.50
1,3-二脱氧-3-羟丙糖基甘油三酯/1,3-dideoxy-3-hydroxy-glycerol	g 0.16	3.2
叶黄素/Zeaxanthin	μg 10.0	203.0
核苷酸/nucleotides	mg 1.5	30.0
脱氢胆汁酸/taurocholatin	mg 1.6	33.0
胆酸胆碱/taurocholine	mg 1.5	30.0

每100毫升含乳液14.1克。
6 904591 019561 >

贝因美®

转奶小贴士 Milk transfer tips

说明: 贝因美不同阶段奶粉配方不同。为了顺利过渡, 需要给宝宝循序渐进的进行转奶过程, 以宝宝每天吃4顿奶粉为标准。

第1-3天	第4-5天	第6-7天	第8天
母乳	母乳	母乳	母乳
奶粉	奶粉	奶粉	奶粉

温馨提示: 转奶应选择宝宝体质适合时进行。在生病或者出现其他身体不适时应立即停止转奶。转奶时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握转奶是否适合宝宝。

以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉

含二十二碳六烯酸(DHA)
含核苷酸
含牛磺酸
含牛磺酸

重要声明 Important Notice

6个月龄以上较大婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

喂养用量建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量/(匙)	用水量/(毫升)	每日喂养次数
6-12月龄	7	205	4

请使用贝因美奶粉专用量匙, 一平匙奶粉约4.5克。

冲调及食用方法 Preparation

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶粉和奶瓶在沸水中煮沸消毒。

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂养用量建议表喂养, 除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害! 切记不要将冲调好离乳期的奶液留到下次食用。请在保质期内食用, 开封后必须保证密封, 建议在一个月内食用。

如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用, 并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50℃, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。

- 按喂养用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。

- 盖好瓶盖, 摆晃奶瓶直至奶粉完全溶解。

- 喂哺前测试奶的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在小时内喂养, 食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅供参考, 请以实物为准

序号 4：贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉（6-12 月龄，2 段）150 克 变更标签稿件

配料 Ingredients	营养成分表 nutrition information								
<p>项目/Items 每100克 /per 100g 每100克 /per 100g</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>基粉 (生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油 (13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、葵花籽油、大豆油、棕榈仁油、玉米油、椰子油、磷脂)、全脂乳粉、乳糖、低聚半乳糖 (GOS)、脱脂乳粉、低聚果糖 (FOS)、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白磷酸肽、棕榈酸 (5'-胆苷酸-2-钠, 5'-尿苷酸-2-钠, 5'-单磷酸腺苷, 5'-肌苷酸-2-钠, 5'-鸟苷酸-2-钠)、溶剂氢化胆碱 (胆碱)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱/酒石酸盐 (左旋肉碱)、蛋氨酸、胱氨酸三钙、氯化钾、柠檬酸钾、硫酸镁、碘化钾、亚硒酸钠、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、醋酸视黄酯 (维生素A)、胆酰化酶 (维生素D)、d-α-醋酸生育酚 (维生素E)、辅酶Q10 (维生素K)、盐酸胆碱 (维生素B₁)、核黄素 (维生素B₂)、盐酸吡哆醇 (维生素B₆)、烟酰胺 (维生素B₃)、泛酸钙 (泛酸)、叶酸、D-生物素 (生物素)、碘酸钾)、脱盐乳清粉、花生四烯酸 (ARA)、二十二碳六烯酸 (DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁。</th> <th>能量/energy kJ 100.0 204.0 蛋白质/protein g 0.64 13.00 乳清蛋白/whey protein g 0.26 5.30 脂肪/fat g 1.11 22.50 亚油酸/linoleic acid (LA) g 0.18 3.70 D-α-亚油酸/d-linoleic acid (DLA) g 0.18 3.70 碳水化合物/carbohydrate g 2.7 55.0 乳糖/lactose g 2.7 55.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>维生素/Vitamins</td> <td>维生素A/vitamin A μg RE 23 465 维生素D/vitamin D μg I.E 0.60 1.30 维生素E/vitamin E mg α-T.E 0.26 0.40 维生素K/vitamin K μg 1.47 30.00 维生素B₁/vitamin B₁ mg 18 360 维生素B₂/vitamin B₂ mg 1.5 375.0 维生素B₆/vitamin B₆ mg 0.074 150.0 烟酰胺/nicotinamide mg 200 407.6 泛酸/butyric acid mg 3.0 62.0 D-α-醋酸/d-β-hydroxybutyric acid mg 127 260.0 维生素C/vitamin C mg 4.9 100.0 生物素/biotin mg 0.52 10.51 胆碱/choline mg 6.1 123.5</td> </tr> <tr> <td>矿物质/minerals</td> <td>钠/sodium mg 8 160 钾/potassium mg 23 460 铜/copper mg 1.8 240.0 镁/magnesium mg 1.5 31.0 铁/iron mg 0.34 7.00 锌/zinc mg 0.20 4.00 锰/manganese mg 1.72 35.00 钙/calium mg 25 500 磷/phosphorus mg 18 357 碘/iodine mg 4.5 93.0 氯/chloride mg 1.9 380 硒/seleium mg 0.64 13.00</td> </tr> <tr> <td>其他营养素/optional nutrients</td> <td>肌醇/inositol mg 15 30.0 牛磺酸/taurine mg 7.0 40.0 左旋肉碱/l-carnitine mg 0.4 7.8 D-抗坏血酸/d-α-tocopherol (vitamin E) mg 4.7 95.0 D-抗坏血酸/d-α-tocopherol (vitamin E) mg 7.0 142.5 胆酰基寡糖/colocetyl oligosaccharides mg 0.113 2.3 胆酰基寡糖/colocetyl oligosaccharides mg 0.074 15.0 D-抗坏血酸-2-棕榈酸甘油三酯 D-抗坏血酸-2-棕榈酸甘油三酯 mg 0.16 3.2 叶黄素/zeaxanthin mg 10.0 203.0 胱氨酸/cysteine mg 1.5 30.0 羟脯氨酸/hydroxyproline mg 1.5 30.0</td> </tr> </tbody> </table>		基粉 (生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油 (13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、葵花籽油、大豆油、棕榈仁油、玉米油、椰子油、磷脂)、全脂乳粉、乳糖、低聚半乳糖 (GOS)、脱脂乳粉、低聚果糖 (FOS)、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白磷酸肽、棕榈酸 (5'-胆苷酸-2-钠, 5'-尿苷酸-2-钠, 5'-单磷酸腺苷, 5'-肌苷酸-2-钠, 5'-鸟苷酸-2-钠)、溶剂氢化胆碱 (胆碱)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱/酒石酸盐 (左旋肉碱)、蛋氨酸、胱氨酸三钙、氯化钾、柠檬酸钾、硫酸镁、碘化钾、亚硒酸钠、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、醋酸视黄酯 (维生素A)、胆酰化酶 (维生素D)、d-α-醋酸生育酚 (维生素E)、辅酶Q10 (维生素K)、盐酸胆碱 (维生素B ₁)、核黄素 (维生素B ₂)、盐酸吡哆醇 (维生素B ₆)、烟酰胺 (维生素B ₃)、泛酸钙 (泛酸)、叶酸、D-生物素 (生物素)、碘酸钾)、脱盐乳清粉、花生四烯酸 (ARA)、二十二碳六烯酸 (DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁。	能量/energy kJ 100.0 204.0 蛋白质/protein g 0.64 13.00 乳清蛋白/whey protein g 0.26 5.30 脂肪/fat g 1.11 22.50 亚油酸/linoleic acid (LA) g 0.18 3.70 D-α-亚油酸/d-linoleic acid (DLA) g 0.18 3.70 碳水化合物/carbohydrate g 2.7 55.0 乳糖/lactose g 2.7 55.0	维生素/Vitamins	维生素A/vitamin A μg RE 23 465 维生素D/vitamin D μg I.E 0.60 1.30 维生素E/vitamin E mg α-T.E 0.26 0.40 维生素K/vitamin K μg 1.47 30.00 维生素B ₁ /vitamin B ₁ mg 18 360 维生素B ₂ /vitamin B ₂ mg 1.5 375.0 维生素B ₆ /vitamin B ₆ mg 0.074 150.0 烟酰胺/nicotinamide mg 200 407.6 泛酸/butyric acid mg 3.0 62.0 D-α-醋酸/d-β-hydroxybutyric acid mg 127 260.0 维生素C/vitamin C mg 4.9 100.0 生物素/biotin mg 0.52 10.51 胆碱/choline mg 6.1 123.5	矿物质/minerals	钠/sodium mg 8 160 钾/potassium mg 23 460 铜/copper mg 1.8 240.0 镁/magnesium mg 1.5 31.0 铁/iron mg 0.34 7.00 锌/zinc mg 0.20 4.00 锰/manganese mg 1.72 35.00 钙/calium mg 25 500 磷/phosphorus mg 18 357 碘/iodine mg 4.5 93.0 氯/chloride mg 1.9 380 硒/seleium mg 0.64 13.00	其他营养素/optional nutrients	肌醇/inositol mg 15 30.0 牛磺酸/taurine mg 7.0 40.0 左旋肉碱/l-carnitine mg 0.4 7.8 D-抗坏血酸/d-α-tocopherol (vitamin E) mg 4.7 95.0 D-抗坏血酸/d-α-tocopherol (vitamin E) mg 7.0 142.5 胆酰基寡糖/colocetyl oligosaccharides mg 0.113 2.3 胆酰基寡糖/colocetyl oligosaccharides mg 0.074 15.0 D-抗坏血酸-2-棕榈酸甘油三酯 D-抗坏血酸-2-棕榈酸甘油三酯 mg 0.16 3.2 叶黄素/zeaxanthin mg 10.0 203.0 胱氨酸/cysteine mg 1.5 30.0 羟脯氨酸/hydroxyproline mg 1.5 30.0
基粉 (生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油 (13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖、葵花籽油、大豆油、棕榈仁油、玉米油、椰子油、磷脂)、全脂乳粉、乳糖、低聚半乳糖 (GOS)、脱脂乳粉、低聚果糖 (FOS)、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白磷酸肽、棕榈酸 (5'-胆苷酸-2-钠, 5'-尿苷酸-2-钠, 5'-单磷酸腺苷, 5'-肌苷酸-2-钠, 5'-鸟苷酸-2-钠)、溶剂氢化胆碱 (胆碱)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱/酒石酸盐 (左旋肉碱)、蛋氨酸、胱氨酸三钙、氯化钾、柠檬酸钾、硫酸镁、碘化钾、亚硒酸钠、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、醋酸视黄酯 (维生素A)、胆酰化酶 (维生素D)、d-α-醋酸生育酚 (维生素E)、辅酶Q10 (维生素K)、盐酸胆碱 (维生素B ₁)、核黄素 (维生素B ₂)、盐酸吡哆醇 (维生素B ₆)、烟酰胺 (维生素B ₃)、泛酸钙 (泛酸)、叶酸、D-生物素 (生物素)、碘酸钾)、脱盐乳清粉、花生四烯酸 (ARA)、二十二碳六烯酸 (DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、L-抗坏血酸钠 (维生素C)、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸镁。	能量/energy kJ 100.0 204.0 蛋白质/protein g 0.64 13.00 乳清蛋白/whey protein g 0.26 5.30 脂肪/fat g 1.11 22.50 亚油酸/linoleic acid (LA) g 0.18 3.70 D-α-亚油酸/d-linoleic acid (DLA) g 0.18 3.70 碳水化合物/carbohydrate g 2.7 55.0 乳糖/lactose g 2.7 55.0								
维生素/Vitamins	维生素A/vitamin A μg RE 23 465 维生素D/vitamin D μg I.E 0.60 1.30 维生素E/vitamin E mg α-T.E 0.26 0.40 维生素K/vitamin K μg 1.47 30.00 维生素B ₁ /vitamin B ₁ mg 18 360 维生素B ₂ /vitamin B ₂ mg 1.5 375.0 维生素B ₆ /vitamin B ₆ mg 0.074 150.0 烟酰胺/nicotinamide mg 200 407.6 泛酸/butyric acid mg 3.0 62.0 D-α-醋酸/d-β-hydroxybutyric acid mg 127 260.0 维生素C/vitamin C mg 4.9 100.0 生物素/biotin mg 0.52 10.51 胆碱/choline mg 6.1 123.5								
矿物质/minerals	钠/sodium mg 8 160 钾/potassium mg 23 460 铜/copper mg 1.8 240.0 镁/magnesium mg 1.5 31.0 铁/iron mg 0.34 7.00 锌/zinc mg 0.20 4.00 锰/manganese mg 1.72 35.00 钙/calium mg 25 500 磷/phosphorus mg 18 357 碘/iodine mg 4.5 93.0 氯/chloride mg 1.9 380 硒/seleium mg 0.64 13.00								
其他营养素/optional nutrients	肌醇/inositol mg 15 30.0 牛磺酸/taurine mg 7.0 40.0 左旋肉碱/l-carnitine mg 0.4 7.8 D-抗坏血酸/d-α-tocopherol (vitamin E) mg 4.7 95.0 D-抗坏血酸/d-α-tocopherol (vitamin E) mg 7.0 142.5 胆酰基寡糖/colocetyl oligosaccharides mg 0.113 2.3 胆酰基寡糖/colocetyl oligosaccharides mg 0.074 15.0 D-抗坏血酸-2-棕榈酸甘油三酯 D-抗坏血酸-2-棕榈酸甘油三酯 mg 0.16 3.2 叶黄素/zeaxanthin mg 10.0 203.0 胱氨酸/cysteine mg 1.5 30.0 羟脯氨酸/hydroxyproline mg 1.5 30.0								
本品含有乳及乳制品（包括乳糖）、大豆及其制品。对其中过敏者慎用。									
贝因美股份有限公司 (股票代码002570) 地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 电话：0571-28077000 产品标准号：GB 10766-2021 产品类别及属性：较大婴儿配方乳粉(基乳) 生产日期(批号)：见罐底 保质期：24个月 贮存条件：常温、阴凉干燥处 制造商：北海贝因美营养食品有限公司 生产地址：北海市北海大道工业园区11号 产地：广西北海 生产许可证编号：SC12945050200028									
 6 904591 028525 > <small>每听提升净含量约14.5克。</small>									



贝因美®

转奶小贴士 Milk transfer tips

新奶粉	原奶粉
奶粉品种的阶段都涉及配方不同。为了顺利过渡，需要给宝宝循序渐进的进行转奶过程。以宝宝每天4顿奶粉为例：	奶粉品种
第1-3天	第4-5天
1/4	1/4
1/2	1/2
3/4	3/4
1	1

温馨提示：转奶应在宝宝身体健康时进行，在生病或者出现其他身体不适情况不宜转奶。同时，转奶时注意观察宝宝大便的性状，以便掌握宝宝转奶的适应情况。
以上建议仅供参考，实际需根据宝宝的具体情况以判断和调整。

贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉

- 含二十二碳六烯酸(DHA)
- 含核苷酸
- 含牛磺酸

重要声明 Important Notice

6个月龄以上较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

冲调及食用方法 Preparation

1、用清水洗净双手和所有用具。
2、将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。

3、将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C，将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
4、按喂养用量建议表，用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。

5、盖好瓶盖，摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
6、喂哺前测试奶的温度，是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺，食用后剩余的奶液应弃用。

咨询服务热线
95105377或400-1777-177
(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录
www.beingmate.com

贝因美臻爱幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）标签变更证书

国家市场监督管理总局 婴幼儿配方乳粉产品配方变更注册证书

（编号：国食注更字 YP20240204）

产品名称	通用名称	幼儿配方奶粉（12—36月龄，3段）				
	商品名称	贝因美臻爱				
	英文名称	-				
企业名称	中文	北海贝因美营养食品有限公司				
	英文	-				
注册号	国食注字 YP20230463	有效期至	2028年11月13日			
审批结论	<p>经批准，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》的规定，现予变更注册。</p> <p>变更内容为：标签非主要展示版面（顶盖）增加注册商标“贝因美”；标签上删除认证项目“GMP”“HACCP”“ISO9001质量管理体系”“ISO14001环境管理体系”；标签图形变更，标签非主要展示版面（顶盖）增加图形。</p> <p>除上述变更信息外，原证书所载其余信息继续有效。</p>					
变更日期	2024年09月13日					
备注						



序号 5: 贝因美臻爱幼儿配方奶粉 (12-36 月龄, 3 段) 800 克 变更标签稿件



序号 6：贝因美臻爱幼儿配方奶粉（12-36 月龄，3 段）150 克 变更标签稿件

配料 Ingredients			
营养成分表 nutrition information			
项目/Items	每100克/Per 100g	每100克/Per 100g	每100克/Per 100g
基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(13-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、棕榈仁油、玉米油、椰子油、猪油)、脱脂乳粉、全脂乳粉、低聚半乳糖(GOS)、乳糖、低聚果糖(FOS)、浓缩乳清蛋白粉、酪蛋白磷酸肽、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛初乳、胆脂、左旋肉碱硒石蕊盐(左旋肉碱)、碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、柠檬酸钠、硫酸镁、碘化钾、L-抗坏血酸钠(维生素C)、醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、d-α-胎酸生育酚(维生素E)、植物甲酰胆碱(维生素K)、盐酸肌醇素(维生素B5)、核黄素(维生素B2)、盐酸吡哆醇(维生素B6)、烟酰胺(维生素B3)、D-泛酸钙(泛酸)、叶酸、D-生物素(生物素)、脱盐乳清粉、花生四烯酸(ARA)、二十碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、L-抗坏血酸钠(维生素C)、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠。			
本品含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆及其制品，对其过敏者慎用。			
贝因美股份有限公司(股票代码002570) 地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 电话：0571-28077000 产品标准号：GB 10767-2021 产品类别及属性：幼儿配方乳粉(乳基) 生产日期(批号)：见罐底 保质期：24个月 贮存条件：常温、阴凉干燥处 制造商：北海贝因美营养食品有限公司 生产地址：北海市北海大道工业园区11号 产地：广西北海 生产许可证编号：SC12945050200028			
6 904591 028532 >			
每毫升含蛋白质4.5克。			



贝因美®

转奶小贴士 Milk transfer tips

新奶粉	原奶粉
奶粉转换阶段都涉及配方不同，为了顺利过渡，需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡。以宝宝每天吃大勺奶粉为例：	
第1-3天	第4-5天
1勺	1勺

温馨提示：转奶应在宝宝身体健康时进行，在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时，转奶时注意观察宝宝大致的症状，以便掌握宝宝转奶的适应情况。
以上建议仅供参考，实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

贝因美臻爱幼儿配方奶粉



含牛磺酸
含核苷酸

含DHA
含ARA

冲调及食用方法 Preparation

1、用清水洗净双手和所用用具。



2、将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。



3、将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50℃，将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。



4、按喂哺用量建议表，用量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。



5、盖好瓶盖，摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。




6、喂哺前测试奶的温度，是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在小时内喂哺，食用后剩余的奶液应弃用。



图示仅作参考，请以实物为准

800 克贝因美臻爱系列顶盖贴 (113.8mm×108mm) 变更标签稿件



150 克贝因美臻爱系列顶盖贴 (65mm×65mm) 变更标签稿件

